



Корь

очень заразная вирусная инфекция

Источник инфекции — больной человек, который становится заразным за несколько дней до появления симптомов.

Путь передачи - воздушно-капельный: вирус выделяется с капельками слюны во время чихания и кашля. Заражение возможно даже при кратковременном контакте.

Симптомы: температура до 40°, кашель, насморк, конъюнктивит, пятна Филатова-Коплика (белые пятна, окруженные каймой, на слизистой оболочке щек), сыпь.

Сыпь при кори появляется этапно:

- сначала на волосистой части головы, за ушами и лице,
- далее - на туловище, руках и бедрах,
- затем покрывает голени и стопы.

Осложнения кори: пневмония, коревой энцефалит, менингит, ларингиты, отит, менингоэнцефалит, слепота

Вакцинация - лучшая защита от кори!

Детей прививают по схеме:

V - в 12 месяцев

RV - в 6 лет

Вакцинация взрослым проводится в **2 этапа** с интервалом в **3 месяца**.

Взрослым, не привитым, не болевшим и привитым однократно, прививки против кори проводят до 35 лет, декретированным контингентам – до 55 лет.

Люди, не болевшие корью и не привитые против нее, могут заболеть в любом возрасте!



Экстренная вакцинация в очаге кори:

Проводится **независимо от возраста** всем контактным, кто не болел корью, не привит или не имеет сведений о прививках.

Проводится в **кратчайшие сроки** с момента выявления больного:

- **в течение 72 часов** - при близком контакте,
- **в течение 7 дней** - при отдаленном контакте.

Детям, не достигшим прививочного возраста, а также лицам с противопоказаниями к вакцинации, вводится иммуноглобулин человека нормальный не позднее 5-го дня от момента контакта.

КОРЬ



Корь — очень заразная вирусная инфекция

Источник инфекции - больной человек

Больной становится заразным за несколько дней до появления симптомов

Как передается - воздушно-капельно

Вирус выделяется с капельками слюны во время чихания и кашля

Восприимчивость к кори - почти 100%

Люди, не болевшие корью и не привитые против нее, могут заболеть в любом возрасте

Симптомы:



Температура до 40°




Кашель



Насморк



Конъюнктивит



Пятна Филатова-Коплика



Сыпь

Лучшая защита от кори - вакцинация!

Детей прививают по схеме:

V - в 12 месяцев

RV - в 6 лет

Взрослым, не привитым, не болевшим и привитым однократно, прививки против кори проводят до 35 лет, декретированным контингентам - до 55 лет

Экстренная вакцинация в очаге кори

Проводится независимо от возраста всем контактным, не болевшим корью ранее, не привитым, привитым однократно и не имеющим сведений о прививках

Проводится в кратчайшие сроки с момента выявления больного:

- в течение 72 часов - при близком контакте
- в течение 7 дней - при отдаленном контакте