

Памятка для владельцев сельскохозяйственных животных по профилактике миксоматоза кроликов



Миксоматоз - очень серьёзное воспалительное заболевание, распространителем которого является вирус. Оно способно поразить абсолютно всех кроликов, будь то домашние или дикие. Сопровождается недугом возникновением образований в виде шишек и сложной формой конъюнктивита с гнойными выделениями.

До проявления начальных признаков болезни (инкубационный период) может пройти несколько дней. Обычно минимальный срок составляет 6 суток. Через 11 дней симптомы становятся совершенно явными. Миксоматоз на первых порах своего развития выказывает себя почти незаметными признаками. Только при внимательном осмотре кролика можно увидеть красные отметины, что вышли на кожном покрове, особенно в виде красных пятен на внутренней поверхности уха.

Ещё одним признаком недуга становится возникновение опухолей. Поначалу это только маленькие неприметные бугорки. Но позже их объёмы увеличиваются. В некоторых случаях размеры образований могут быть не столь значительными - с зёрнышко проса, а в других - по-настоящему огромными, достигая величины голубинового яйца.

Отёки студенистого характера проявляются в разных зонах головы животного. Животное не может полноценно дышать, поскольку вся ротовая полость воспаляется. Из неё выделяется гнойная слизь. Порой кролики дышат с интенсивными хрипами.

В большинстве случаев все симптомы длятся максимум 11 суток. Затем кролик становится равнодушен к пище, воде, никак не реагирует на голоса,

звуки, прикосновения. Если животное не отличалось хорошим иммунитетом, оно умирает. Если же кролик достаточно силён, при должном лечении он идёт на поправку. После окончательного выздоровления никаких признаков тяжёлого недуга не остаётся.

Профилактическими мероприятиями, направленными на предупреждение миксоматоза кроликов, является необходимость ежегодной плановой вакцинации кроликов всех возрастов.